数学Ⅱ，数学Ｂ，数学Ｃ

<table>
<tr><th>問　題</th><th>選　択　方　法</th></tr>
<tr><td>第１問</td><td>必　　答</td></tr>
<tr><td>第２問</td><td>必　　答</td></tr>
<tr><td>第３問</td><td>必　　答</td></tr>
<tr><td>第４問</td><td rowspan="4">いずれか３問を選択し，解答しなさい。</td></tr>
<tr><td>第５問</td></tr>
<tr><td>第６問</td></tr>
<tr><td>第７問</td></tr>
</table>

第1問　（必答問題）（配点　15）

(1)　$0 \leqq \theta < \pi$ のとき，方程式

$$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = \sin 2\theta \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \text{①}$$

の解を求めよう。以下では，$\alpha = \theta + \frac{\pi}{6}$，$\beta = 2\theta$ とおく。このとき，① は

$$\sin\alpha = \sin\beta \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \text{②}$$

となる。

(i)　二つの一般角 α と β が等しければ，$\sin\alpha$ と $\sin\beta$ は等しい。$\alpha = \beta$ を満たす θ は $\frac{\pi}{\boxed{\text{ア}}}$ であり，これは① の解の一つである。そして，$\theta = \frac{\pi}{\boxed{\text{ア}}}$ のとき

$$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = \sin 2\theta = \frac{\sqrt{\boxed{\text{イ}}}}{\boxed{\text{ウ}}}$$

となる。

（数学Ⅱ，数学B，数学C第1問は次ページに続く。）

(ii) 太郎さんと花子さんは，$\theta = \dfrac{\pi}{\boxed{\text{ア}}}$ 以外の ① の解を求める方法について話している。

太郎：角が等しくなくても，サインの値が等しくなることがあるね。
花子：サインの値が等しくなるのはどんなときか，単位円を用いて考えてみようか。

O を原点とする座標平面において，中心が O で，半径が 1 の円を C とする。さらに，α の動径と C との交点を P，β の動径と C との交点を Q とする。ここで，動径は O を中心とし，その始線は x 軸の正の部分とする。



参考図

② が成り立つときに，点 P と点 Q の間につねに成り立つ関係の記述として，次の⓪～③のうち，正しいものは $\boxed{\text{エ}}$ である。

$\boxed{\text{エ}}$ の解答群

⓪ 点 P と点 Q は同じ点である。
① 点 P の x 座標と，点 Q の x 座標が等しい。
② 点 P の y 座標と，点 Q の y 座標が等しい。
③ 点 P と点 Q は，原点 O に関して対称である。

（数学Ⅱ，数学B，数学C第1問は次ページに続く。）

(iii) $\theta \neq \dfrac{\pi}{\boxed{\text{ア}}}$ とする。

- $0 \leqq \theta \leqq \dfrac{\pi}{2}$ の場合を考える。このとき，$0 \leqq \beta \leqq \pi$ であるので，② が成り立つとき，(ii) で考察したことに注意すると，α と β は

$$\alpha + \beta = \boxed{\text{オ}}$$

を満たすことがわかる。これより，$0 \leqq \theta \leqq \dfrac{\pi}{2}$ のときの ① の解

$$\theta = \frac{\boxed{\text{カ}}}{\boxed{\text{キク}}}\pi$$

を得る。

- $\dfrac{\pi}{2} < \theta < \pi$ の場合を考える。このとき，$\pi < \beta < 2\pi$ であるので，② が成り立つとき，(ii) で考察したことに注意すると，α と β は

$$\alpha + \beta = \boxed{\text{ケ}}$$

を満たすことがわかる。これより，$\dfrac{\pi}{2} < \theta < \pi$ のときの ① の解

$$\theta = \frac{\boxed{\text{コサ}}}{\boxed{\text{シス}}}\pi$$

を得る。

（数学Ⅱ，数学B，数学C第1問は次ページに続く。）

以上より，$0 \leqq \theta < \pi$ のとき，① の解は

$$\theta = \frac{\pi}{\boxed{\text{ア}}},\ \frac{\boxed{\text{カ}}}{\boxed{\text{キク}}}\pi,\ \frac{\boxed{\text{コサ}}}{\boxed{\text{シス}}}\pi$$

である。

$\boxed{\text{オ}}$，$\boxed{\text{ケ}}$ の解答群(同じものを繰り返し選んでもよい。)

⓪ 0	① $\frac{\pi}{2}$	② π	③ $\frac{3}{2}\pi$
④ 2π	⑤ $\frac{5}{2}\pi$	⑥ 3π	⑦ $\frac{7}{2}\pi$

⑵　$0 \leqq \theta < \pi$ のとき，方程式

$$\cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = \cos 2\theta$$

の解は

$$\theta = \frac{\pi}{\boxed{\text{セ}}},\ \frac{\boxed{\text{ソタ}}}{\boxed{\text{チツ}}}\pi$$

である。

数学Ⅱ，数学B，数学C

第 2 問 （必答問題）（配点　15）

以下の問題を解答するにあたっては，必要に応じて 12，13 ページの常用対数表を用いてもよい。

学校の池でメダカを飼うことが決まり，メダカの飼育係になった花子さんは，水質を良くする効果がある水草 A を水面に浮かべることにした。一方で，水草 A が増えすぎてメダカに悪影響を与えることを心配した花子さんは，水草 A を定期的に除去することにし，その作業の計画を立てるために次の**基本方針**を定めた。

基本方針

- 水草 A の量を水草 A が池の水面を覆う面積の割合（%）で測ることにし，この量をもとに作業計画を立てる。
- 作業は正午に行う。

（数学Ⅱ，数学B，数学C 第 2 問は次ページに続く。）

(1) 水草Aの増え方を知るために，観測を行った。次の表は，観測を開始した日を0日目として，0日目，3日目，6日目，9日目の正午に観測した水草Aの量を表したものである。

観測日(日目)	0	3	6	9
水草Aの量(%)	17.2	22.7	30.0	39.6

水草Aの量が3日ごとに何倍に増えるのかを計算して小数第3位を四捨五入したところ，いずれも1.32倍であることがわかった。水草Aの量は，3日ごとにほとんど同じ倍率で増えていることから，「水草Aの量は，1日ごとに一定の倍率で増える」と考え，その倍率を定数rとした。

観測結果から，3日目の水草Aの量は0日目の量の1.32倍になると考えた。このとき，rは［ア］$= 1.32$を満たす。$\log_{10} 1.32 =$［イ］であるので

$$\log_{10} r = 0.\boxed{ウエオカ}$$

が得られる。

［ア］の解答群

⓪ r　① $\frac{r}{3}$　② $3r$　③ r^3　④ 3^r　⑤ $\log_3 r$

［イ］については，最も適当なものを，次の⓪～⑦のうちから一つ選べ。

⓪ 0.0899	① 0.1206	② 0.1523	③ 0.2148
④ 0.2405	⑤ 0.3010	⑥ 0.3636	⑦ 0.4771

（数学Ⅱ，数学B，数学C第2問は次ページに続く。）

⑵　花子さんは，**基本方針**に次の**条件**を加えて，作業計画を立てることにした。

条件

- 作業は 14 日ごとに行う。
- 作業の後に残す水草 A の量を，次回の作業までの間に水草 A の量がつねに 60 % を超えない範囲で，できるだけ多くする。

作業の後に残す水草 A の量について考える。

作業を行った日を 0 日目として，次回の作業は 14 日目に行う。なお，作業にかかる時間は考えないものとする。

次のような実数 a を考える。作業の後に残す水草 A の量を a % としたとき，14 日目の正午に水草 A の量がちょうど 60 % になる。

このとき，⑴の定数 r を用いると，14 日目の正午に水草 A の量は a の［キ］倍になるので

$$a \times [\text{キ}] = [\text{クケ}] \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \text{①}$$

が成り立つ。

（数学Ⅱ，数学B，数学C 第 2 問は次ページに続く。）

①の両辺の常用対数をとり，(1)で求めた$\log_{10} r = 0.$ ウエオカ と $\log_{10} 6 = 0.7782$ であることを用いると，$\log_{10} a =$ コ となる。

a の決め方から，作業の後に残す水草Aの量を a % 以下にすれば，次回の作業までの間に水草Aの量がつねに 60 % を超えないことがわかる。a 以下で最大の整数は サシ であることから，花子さんは作業の後に残す水草Aの量を サシ % にすることとした。

キ の解答群

⓪ r	① $\frac{r}{14}$	② $14r$	③ r^{14}	④ 14^r	⑤ $\log_{14} r$

コ については，最も適当なものを，次の⓪～⑦のうちから一つ選べ。

⓪ 0.7758	① 1.0670	② 1.0934	③ 1.2154
④ 1.3410	⑤ 1.4894	⑥ 1.7806	⑦ 2.4666

（数学Ⅱ，数学B，数学C第2問は次ページに続く。）

常　用　対　数　表

数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	0.0000	0.0043	0.0086	0.0128	0.0170	0.0212	0.0253	0.0294	0.0334	0.0374
1.1	0.0414	0.0453	0.0492	0.0531	0.0569	0.0607	0.0645	0.0682	0.0719	0.0755
1.2	0.0792	0.0828	0.0864	0.0899	0.0934	0.0969	0.1004	0.1038	0.1072	0.1106
1.3	0.1139	0.1173	0.1206	0.1239	0.1271	0.1303	0.1335	0.1367	0.1399	0.1430
1.4	0.1461	0.1492	0.1523	0.1553	0.1584	0.1614	0.1644	0.1673	0.1703	0.1732
1.5	0.1761	0.1790	0.1818	0.1847	0.1875	0.1903	0.1931	0.1959	0.1987	0.2014
1.6	0.2041	0.2068	0.2095	0.2122	0.2148	0.2175	0.2201	0.2227	0.2253	0.2279
1.7	0.2304	0.2330	0.2355	0.2380	0.2405	0.2430	0.2455	0.2480	0.2504	0.2529
1.8	0.2553	0.2577	0.2601	0.2625	0.2648	0.2672	0.2695	0.2718	0.2742	0.2765
1.9	0.2788	0.2810	0.2833	0.2856	0.2878	0.2900	0.2923	0.2945	0.2967	0.2989
2.0	0.3010	0.3032	0.3054	0.3075	0.3096	0.3118	0.3139	0.3160	0.3181	0.3201
2.1	0.3222	0.3243	0.3263	0.3284	0.3304	0.3324	0.3345	0.3365	0.3385	0.3404
2.2	0.3424	0.3444	0.3464	0.3483	0.3502	0.3522	0.3541	0.3560	0.3579	0.3598
2.3	0.3617	0.3636	0.3655	0.3674	0.3692	0.3711	0.3729	0.3747	0.3766	0.3784
2.4	0.3802	0.3820	0.3838	0.3856	0.3874	0.3892	0.3909	0.3927	0.3945	0.3962
2.5	0.3979	0.3997	0.4014	0.4031	0.4048	0.4065	0.4082	0.4099	0.4116	0.4133
2.6	0.4150	0.4166	0.4183	0.4200	0.4216	0.4232	0.4249	0.4265	0.4281	0.4298
2.7	0.4314	0.4330	0.4346	0.4362	0.4378	0.4393	0.4409	0.4425	0.4440	0.4456
2.8	0.4472	0.4487	0.4502	0.4518	0.4533	0.4548	0.4564	0.4579	0.4594	0.4609
2.9	0.4624	0.4639	0.4654	0.4669	0.4683	0.4698	0.4713	0.4728	0.4742	0.4757
3.0	0.4771	0.4786	0.4800	0.4814	0.4829	0.4843	0.4857	0.4871	0.4886	0.4900
3.1	0.4914	0.4928	0.4942	0.4955	0.4969	0.4983	0.4997	0.5011	0.5024	0.5038
3.2	0.5051	0.5065	0.5079	0.5092	0.5105	0.5119	0.5132	0.5145	0.5159	0.5172
3.3	0.5185	0.5198	0.5211	0.5224	0.5237	0.5250	0.5263	0.5276	0.5289	0.5302
3.4	0.5315	0.5328	0.5340	0.5353	0.5366	0.5378	0.5391	0.5403	0.5416	0.5428
3.5	0.5441	0.5453	0.5465	0.5478	0.5490	0.5502	0.5514	0.5527	0.5539	0.5551
3.6	0.5563	0.5575	0.5587	0.5599	0.5611	0.5623	0.5635	0.5647	0.5658	0.5670
3.7	0.5682	0.5694	0.5705	0.5717	0.5729	0.5740	0.5752	0.5763	0.5775	0.5786
3.8	0.5798	0.5809	0.5821	0.5832	0.5843	0.5855	0.5866	0.5877	0.5888	0.5899
3.9	0.5911	0.5922	0.5933	0.5944	0.5955	0.5966	0.5977	0.5988	0.5999	0.6010
4.0	0.6021	0.6031	0.6042	0.6053	0.6064	0.6075	0.6085	0.6096	0.6107	0.6117
4.1	0.6128	0.6138	0.6149	0.6160	0.6170	0.6180	0.6191	0.6201	0.6212	0.6222
4.2	0.6232	0.6243	0.6253	0.6263	0.6274	0.6284	0.6294	0.6304	0.6314	0.6325
4.3	0.6335	0.6345	0.6355	0.6365	0.6375	0.6385	0.6395	0.6405	0.6415	0.6425
4.4	0.6435	0.6444	0.6454	0.6464	0.6474	0.6484	0.6493	0.6503	0.6513	0.6522
4.5	0.6532	0.6542	0.6551	0.6561	0.6571	0.6580	0.6590	0.6599	0.6609	0.6618
4.6	0.6628	0.6637	0.6646	0.6656	0.6665	0.6675	0.6684	0.6693	0.6702	0.6712
4.7	0.6721	0.6730	0.6739	0.6749	0.6758	0.6767	0.6776	0.6785	0.6794	0.6803
4.8	0.6812	0.6821	0.6830	0.6839	0.6848	0.6857	0.6866	0.6875	0.6884	0.6893
4.9	0.6902	0.6911	0.6920	0.6928	0.6937	0.6946	0.6955	0.6964	0.6972	0.6981
5.0	0.6990	0.6998	0.7007	0.7016	0.7024	0.7033	0.7042	0.7050	0.7059	0.7067
5.1	0.7076	0.7084	0.7093	0.7101	0.7110	0.7118	0.7126	0.7135	0.7143	0.7152
5.2	0.7160	0.7168	0.7177	0.7185	0.7193	0.7202	0.7210	0.7218	0.7226	0.7235
5.3	0.7243	0.7251	0.7259	0.7267	0.7275	0.7284	0.7292	0.7300	0.7308	0.7316
5.4	0.7324	0.7332	0.7340	0.7348	0.7356	0.7364	0.7372	0.7380	0.7388	0.7396

（数学Ⅱ，数学B，数学C第2問は次ページに続く。）

数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.5	0.7404	0.7412	0.7419	0.7427	0.7435	0.7443	0.7451	0.7459	0.7466	0.7474
5.6	0.7482	0.7490	0.7497	0.7505	0.7513	0.7520	0.7528	0.7536	0.7543	0.7551
5.7	0.7559	0.7566	0.7574	0.7582	0.7589	0.7597	0.7604	0.7612	0.7619	0.7627
5.8	0.7634	0.7642	0.7649	0.7657	0.7664	0.7672	0.7679	0.7686	0.7694	0.7701
5.9	0.7709	0.7716	0.7723	0.7731	0.7738	0.7745	0.7752	0.7760	0.7767	0.7774
6.0	0.7782	0.7789	0.7796	0.7803	0.7810	0.7818	0.7825	0.7832	0.7839	0.7846
6.1	0.7853	0.7860	0.7868	0.7875	0.7882	0.7889	0.7896	0.7903	0.7910	0.7917
6.2	0.7924	0.7931	0.7938	0.7945	0.7952	0.7959	0.7966	0.7973	0.7980	0.7987
6.3	0.7993	0.8000	0.8007	0.8014	0.8021	0.8028	0.8035	0.8041	0.8048	0.8055
6.4	0.8062	0.8069	0.8075	0.8082	0.8089	0.8096	0.8102	0.8109	0.8116	0.8122
6.5	0.8129	0.8136	0.8142	0.8149	0.8156	0.8162	0.8169	0.8176	0.8182	0.8189
6.6	0.8195	0.8202	0.8209	0.8215	0.8222	0.8228	0.8235	0.8241	0.8248	0.8254
6.7	0.8261	0.8267	0.8274	0.8280	0.8287	0.8293	0.8299	0.8306	0.8312	0.8319
6.8	0.8325	0.8331	0.8338	0.8344	0.8351	0.8357	0.8363	0.8370	0.8376	0.8382
6.9	0.8388	0.8395	0.8401	0.8407	0.8414	0.8420	0.8426	0.8432	0.8439	0.8445
7.0	0.8451	0.8457	0.8463	0.8470	0.8476	0.8482	0.8488	0.8494	0.8500	0.8506
7.1	0.8513	0.8519	0.8525	0.8531	0.8537	0.8543	0.8549	0.8555	0.8561	0.8567
7.2	0.8573	0.8579	0.8585	0.8591	0.8597	0.8603	0.8609	0.8615	0.8621	0.8627
7.3	0.8633	0.8639	0.8645	0.8651	0.8657	0.8663	0.8669	0.8675	0.8681	0.8686
7.4	0.8692	0.8698	0.8704	0.8710	0.8716	0.8722	0.8727	0.8733	0.8739	0.8745
7.5	0.8751	0.8756	0.8762	0.8768	0.8774	0.8779	0.8785	0.8791	0.8797	0.8802
7.6	0.8808	0.8814	0.8820	0.8825	0.8831	0.8837	0.8842	0.8848	0.8854	0.8859
7.7	0.8865	0.8871	0.8876	0.8882	0.8887	0.8893	0.8899	0.8904	0.8910	0.8915
7.8	0.8921	0.8927	0.8932	0.8938	0.8943	0.8949	0.8954	0.8960	0.8965	0.8971
7.9	0.8976	0.8982	0.8987	0.8993	0.8998	0.9004	0.9009	0.9015	0.9020	0.9025
8.0	0.9031	0.9036	0.9042	0.9047	0.9053	0.9058	0.9063	0.9069	0.9074	0.9079
8.1	0.9085	0.9090	0.9096	0.9101	0.9106	0.9112	0.9117	0.9122	0.9128	0.9133
8.2	0.9138	0.9143	0.9149	0.9154	0.9159	0.9165	0.9170	0.9175	0.9180	0.9186
8.3	0.9191	0.9196	0.9201	0.9206	0.9212	0.9217	0.9222	0.9227	0.9232	0.9238
8.4	0.9243	0.9248	0.9253	0.9258	0.9263	0.9269	0.9274	0.9279	0.9284	0.9289
8.5	0.9294	0.9299	0.9304	0.9309	0.9315	0.9320	0.9325	0.9330	0.9335	0.9340
8.6	0.9345	0.9350	0.9355	0.9360	0.9365	0.9370	0.9375	0.9380	0.9385	0.9390
8.7	0.9395	0.9400	0.9405	0.9410	0.9415	0.9420	0.9425	0.9430	0.9435	0.9440
8.8	0.9445	0.9450	0.9455	0.9460	0.9465	0.9469	0.9474	0.9479	0.9484	0.9489
8.9	0.9494	0.9499	0.9504	0.9509	0.9513	0.9518	0.9523	0.9528	0.9533	0.9538
9.0	0.9542	0.9547	0.9552	0.9557	0.9562	0.9566	0.9571	0.9576	0.9581	0.9586
9.1	0.9590	0.9595	0.9600	0.9605	0.9609	0.9614	0.9619	0.9624	0.9628	0.9633
9.2	0.9638	0.9643	0.9647	0.9652	0.9657	0.9661	0.9666	0.9671	0.9675	0.9680
9.3	0.9685	0.9689	0.9694	0.9699	0.9703	0.9708	0.9713	0.9717	0.9722	0.9727
9.4	0.9731	0.9736	0.9741	0.9745	0.9750	0.9754	0.9759	0.9763	0.9768	0.9773
9.5	0.9777	0.9782	0.9786	0.9791	0.9795	0.9800	0.9805	0.9809	0.9814	0.9818
9.6	0.9823	0.9827	0.9832	0.9836	0.9841	0.9845	0.9850	0.9854	0.9859	0.9863
9.7	0.9868	0.9872	0.9877	0.9881	0.9886	0.9890	0.9894	0.9899	0.9903	0.9908
9.8	0.9912	0.9917	0.9921	0.9926	0.9930	0.9934	0.9939	0.9943	0.9948	0.9952
9.9	0.9956	0.9961	0.9965	0.9969	0.9974	0.9978	0.9983	0.9987	0.9991	0.9996

第3問 （必答問題）（配点 22）

k を 0 でない実数とし，$f(x)$ を 2 次関数とする。$F(x)$ と $G(x)$ はどちらも導関数が $f(x)$ であるような関数で，$F(x)$ は $x = 0$ で極小値 0 をとり，$G(x)$ は $x = k$ で極大値 0 をとるとする。

(1) まず，$F(x) = 2x^3 + 3x^2$ の場合を考える。

$F(x)$ の導関数が $f(x)$ であることから

$$f(x) = \boxed{\text{ア}}x^2 + \boxed{\text{イ}}x$$

であり，$F(x)$ は $x = \boxed{\text{ウエ}}$ で極大値をとる。また，$G(x)$ の導関数が $f(x)$ であることから

$$G(x) = \boxed{\text{オ}}x^3 + \boxed{\text{カ}}x^2 + C \quad (C \text{は積分定数})$$

と表され，$G(x)$ は $x = \boxed{\text{キ}}$ で極小値をとる。さらに $G(x)$ に関する条件から $C = \boxed{\text{クケ}}$ である。

(2) 次に，$k > 0$ の場合を考える。

このとき，$F(x)$ と $G(x)$ に関する条件から，$y = F(x)$ のグラフと $F(x)$，$G(x)$ の極値について調べよう。

(i) $F(x)$ が $x = 0$ で極小値をとることから，$f(0) = \boxed{\text{コ}}$ であり，$x = 0$ の前後で $f(x)$ の符号は $\boxed{\text{サ}}$。さらに，$G(x)$ が $x = k$ で極大値をとることから，$f(k) = \boxed{\text{シ}}$ であり，$x = k$ の前後で $f(x)$ の符号は $\boxed{\text{ス}}$。したがって，$F(x)$ の導関数は $f(x)$ であることに注意すると，座標平面において $y = F(x)$ のグラフの概形は $\boxed{\text{セ}}$ であることがわかる。

（数学Ⅱ，数学B，数学C 第3問は次ページに続く。）

サ ， ス の解答群（同じものを繰り返し選んでもよい。）

⓪ 負から正に変わる	① 正から負に変わる
② 変わらない	

セ については，最も適当なものを，次の⓪～⑤のうちから一つ選べ。なお，y 軸は省略しているが，上方向が正の方向であり，x 軸は直線 $y = 0$ を表している。

⓪



①



②



③



④



⑤



（数学Ⅱ，数学B，数学C 第3問は次ページに続く。）

(ii) $F(x)$に関する条件から，すべての実数xに対して

$$F(x)=\int_{\boxed{タ}}^{\boxed{ソ}} f(t)\,dt$$

が成り立つ。このことと(i)の考察により，$F(x)$の極大値は

$$\int_{\boxed{ツ}}^{\boxed{チ}} f(t)\,dt$$

と表され，$F(x)$の極大値は，関数$y=$ テ のグラフとx軸で囲まれた図形の ト と等しいことがわかる。

さらに$G(x)$に関する条件から，$F(x)$の極大値は，$G(x)$の ナ と等しいことがわかる。

（数学Ⅱ，数学B，数学C第3問は次ページに続く。）

ソ ～ ツ の解答群（同じものを繰り返し選んでもよい。）

⓪ 0	① 1	② k	③ x

テ の解答群

⓪ $f(x)$	① $F(x)$	② $G(x)$

ト の解答群

⓪ 面積	① 面積の -1 倍

ナ の解答群

⓪ 極小値	① 極大値
② 極小値の -1 倍	③ 極大値の -1 倍

第4問　（選択問題）（配点　16）

座標平面上で，x 座標と y 座標がともに整数である点を格子点という。いくつかの直線や曲線で囲まれた図形の内部にある格子点の個数を考えよう。ただし，図形の内部は，境界（境界線）を含まないものとする。

例えば，直線 $y = -x + 5$ と x 軸，y 軸で囲まれた図形を S とする。S は図1の灰色部分であり，S の内部にある格子点を黒丸，内部にない格子点を白丸で表している。したがって，S の内部にある格子点の個数は6である。



図　1

（数学Ⅱ，数学B，数学C第4問は次ページに続く。）

(1) 直線 $y = 3x$ と x 軸，直線 $x = 21$ で囲まれた図形を T とする。T の内部にある格子点の個数を考える。

直線 $x = 1$ 上の格子点で T の内部にあるものは，点(1，1)と点(1，2)の2個である。点(1，0)と点(1，3)は T の境界にあるため，内部にはない。

n を整数とする。直線 $x = n$ が T の内部にある格子点を通るのは，$1 \leqq n \leqq 20$ のときである。$1 \leqq n \leqq 20$ のとき，直線 $x = n$ 上の格子点で T の内部にあるものの個数を a_n とおく。$a_1 = 2$ であり，$a_2 =$ **ア**，$a_3 =$ **イ** である。数列 $\{a_n\}$ は **ウ** が **エ** の **オ** 数列である。

したがって，T の内部にある格子点の個数は **カキク** である。

ウ の解答群

⓪ 公　差	① 公　比

オ の解答群

⓪ 等　差	① 等　比

(数学Ⅱ，数学B，数学C第4問は次ページに続く。)

⑵ n を自然数とする。関数 $y = 2^x$ のグラフと x 軸，y 軸および直線 $x = n + 1$ で囲まれた図形を U とする。

k を整数とする。直線 $x = k$ が U の内部にある格子点を通るとき，直線 $x = k$ 上の格子点で U の内部にあるものの個数は［ケ］である。

したがって，U の内部にある格子点の個数は

$$\sum_{k=1}^{［コ］}\left(［ケ］\right) = ［サ］$$

である。

（数学Ⅱ，数学B，数学C第4問は次ページに続く。）

［ケ］の解答群

⓪ $2k-2$	① $2k-1$	② $2k$
③ $2^{k-1}-2$	④ $2^{k-1}-1$	⑤ 2^{k-1}
⑥ $2^{k}-2$	⑦ $2^{k}-1$	⑧ 2^{k}

［コ］の解答群

⓪ $n-1$	① n	② $n+1$
③ $2n-1$	④ $2n$	⑤ $2n+1$
⑥ $2^{n}-1$	⑦ 2^{n}	⑧ $2^{n}+1$

［サ］の解答群

⓪ $2^{n}-2n-1$	① $2^{n}-2n$	② $2^{n}-n-1$
③ $2^{n}-n$	④ $2^{n}-3$	⑤ $2^{n+1}-2n-2$
⑥ $2^{n+1}-2n-1$	⑦ $2^{n+1}-n-2$	⑧ $2^{n+1}-n-1$
⑨ $2^{n+1}-3$		

（数学Ⅱ，数学B，数学C第4問は次ページに続く。）

(3) a，b，cは整数で，$a > 0$，$b^2 - 4ac < 0$を満たすとする。放物線$y = ax^2 + bx + c$とx軸，y軸および直線$x = n + 1$で囲まれた図形をVとする。すべての自然数nに対して，Vの内部にある格子点の個数がn^3となるのは，$a =$ シ ，$b =$ スセ ，$c =$ ソ のときである。

数学Ⅱ，数学B，数学C **第4問～第7問は，いずれか3問を選択し，解答しなさい。**

第5問 （選択問題）（配点 16）

以下の問題を解答するにあたっては，必要に応じて31ページの正規分布表を用いてもよい。

Q地域ではレモンを栽培しており，収穫されるレモンを重さによってサイズごとに分類している（表1）。過去に収穫されたレモンの重さは，平均が110 g，標準偏差が20 gの正規分布に従うとする。

表1　レモンのサイズと重さの対応関係

サイズ	レモン1個の重さ
S	80 g以上90 g未満
M	90 g以上110 g未満
L	110 g以上140 g未満
2L	140 g以上170 g未満
その他	80 g未満または170 g以上

（数学Ⅱ，数学B，数学C第5問は次ページに続く。）

(1) Q地域で今年収穫されるレモンの重さ(単位はg)は，過去に収穫されたレモンの重さと同じ分布に従うとする。すなわち，今年収穫される1個のレモンの重さを確率変数Xで表すと，Xは正規分布$N(110,\ 20^2)$に従うとする。よって，今年収穫されるレモンから無作為にレモンを1個抽出するとき，そのレモンがLサイズである確率は，$P(110 \leqq X < 140) = P(110 \leqq X \leqq 140)$であることに注意すると，0. アイウエ である。

いま，Q地域で今年収穫されるレモンが20万個であるとし，その中のLサイズのレモンの個数を確率変数Yで表すと，Yは二項分布に従い，Yの平均(期待値)は オ となる。

オ については，最も適当なものを，次の⓪～⑦のうちから一つ選べ。

⓪ 13100	① 13360	② 31740	③ 68260
④ 86640	⑤ 100000	⑥ 168260	⑦ 186640

(数学Ⅱ，数学B，数学C第5問は次ページに続く。)

⑵　太郎さんと花子さんは，Q地域で今年収穫されるレモンから何個かを抽出して，今年収穫されるレモンの重さの平均(母平均)を推定する方法について話している。

太郎：母平均に対する信頼度95％の信頼区間の幅を4g以下にして推定したいね。
花子：母標準偏差を過去と同じ20gとすると，何個のレモンの重さを量ればいいかな。
太郎：信頼区間の式から，必要な標本の大きさを求めてみようよ。

母平均に対する信頼度95％の信頼区間の幅を4g以下にするために必要な標本の大きさを求める。いま，Q地域で今年収穫されるレモン全体を母集団とし，その重さの母平均をmg，母標準偏差をσgとする。この母集団から無作為に抽出したn個のレモンの重さを確率変数W_1，W_2，…，W_nで表すと，標本の大きさnが十分に大きいとき，標本平均$\overline{W}=\dfrac{1}{n}(W_1+W_2+\cdots+W_n)$は近似的に正規分布$N\left(m,\ \boxed{\text{カ}}\right)$に従う。また，$m$に対する信頼度95％の信頼区間を$A \leqq m \leqq B$と表すと，信頼区間の幅は$B-A=\dfrac{\boxed{\text{キ}}}{\sqrt{n}}$となる。

したがって，母標準偏差を過去と同じ$\sigma=20$として，nに関する不等式

$$\frac{\boxed{\text{キ}}}{\sqrt{n}} \leqq 4 \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \text{①}$$

を満たす自然数nを求めればよい。①の両辺は正であるから，両辺を2乗して整理すると，$\left(\boxed{\text{キ}}\right)^2 \leqq 16n$となる。この不等式を満たす最小の自然数$n$を$n_0$とすると，$n_0=$ **クケコ** である。ゆえに，mに対する信頼度95％の信頼区間の幅を4g以下にするために必要な標本の大きさnのうち，最小のものは クケコ であることがわかる。

(数学Ⅱ，数学B，数学C第5問は次ページに続く。)

［カ］の解答群

⓪ σ	① $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$	② $\dfrac{\sqrt{\sigma}}{n}$	③ $\dfrac{\sigma}{n}$
④ σ^2	⑤ $\dfrac{\sigma^2}{\sqrt{n}}$	⑥ $\dfrac{\sigma^2}{n}$	⑦ $\dfrac{\sigma^2}{n^2}$

［キ］については，最も適当なものを，次の⓪～⑤のうちから一つ選べ。

⓪ σ	① 1.65σ	② 1.96σ
③ 2σ	④ 3.3σ	⑤ 3.92σ

（数学Ⅱ，数学B，数学C第5問は次ページに続く。）

⑶　太郎さんと花子さんは，Q地域で今年収穫されるレモンの重さについて話している。

太郎：今年のレモンの重さは，他の地域では例年よりも軽そうだと聞いたよ。
花子：Q地域でも，過去の平均110 gと比べて軽いのかな。
太郎：標本の大きさを400，母標準偏差を過去と同じ20 gとして，仮説検定をしてみようよ。

⑵のmを用いて，Q地域で今年収穫されるレモンの重さの母平均m gが過去の平均110 gより軽いといえるかを，有意水準5 %(0.05)で仮説検定を行い検証したい。ただし，標本の大きさは400，母標準偏差は過去と同じ20 gとする。ここで，統計的に検証したい仮説を「対立仮説」，対立仮説に反する仮定として設けた仮説を「帰無仮説」とする。このとき，帰無仮説は「$m = 110$」，対立仮説は「［サ］」である。これらの仮説に対して，有意水準5 %で帰無仮説が棄却(否定)されるかどうかを判断する。

いま，帰無仮説が正しいと仮定する。標本の大きさ400は十分に大きいので，⑵の標本平均$\overline{W}$は近似的に正規分布［シ］に従う。無作為抽出した400個のレモンの重さの平均が108.2 gとなった。このとき，確率$P(\overline{W} \leqq 108.2)$は0.［スセソタ］となる。この値をパーセント表示した値は有意水準5 %より［チ］。したがって，有意水準5 %で今年収穫されるレモンの重さの母平均は110 gより軽いと［ツ］。

（数学Ⅱ，数学B，数学C第5問は次ページに続く。）

サ の解答群

⓪ $m < 110$	① $m \leqq 110$	② $m = 110$
③ $m \geqq 110$	④ $m > 110$	

シ の解答群

⓪ $N(108.2,\ 400)$	① $N(108.2,\ 20)$	② $N(108.2,\ 1)$
③ $N(110,\ 400)$	④ $N(110,\ 20)$	⑤ $N(110,\ 1)$

チ の解答群

⓪ 小さいから，帰無仮説は棄却されない
① 小さいから，帰無仮説は棄却される
② 大きいから，帰無仮説は棄却されない
③ 大きいから，帰無仮説は棄却される

ツ の解答群

⓪ 判断できる	① 判断できない

（数学Ⅱ，数学B，数学C第5問は31ページに続く。）

正　規　分　布　表

次の表は，標準正規分布の分布曲線における右図の灰色部分の面積の値をまとめたものである。



z_0	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
3.1	0.4990	0.4991	0.4991	0.4991	0.4992	0.4992	0.4992	0.4992	0.4993	0.4993
3.2	0.4993	0.4993	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4995	0.4995	0.4995
3.3	0.4995	0.4995	0.4995	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4997
3.4	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4998
3.5	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998

第6問　（選択問題）（配点　16）

Oを原点とする座標空間において，Oを中心とする半径1の球面をSとする。S上に二つの点A$(1, 0, 0)$，B$(a, \sqrt{1-a^2}, 0)$をとる。ただし，aは$-1 < a < 1$を満たす実数とする。S上の点Cを，△ABCが正三角形となるようにとれるかどうかを考えてみよう。



参考図

(1)　点Cの座標を(x, y, z)とする。CがS上にあるとき

$$|\overrightarrow{OC}|^2 = \boxed{\text{ア}}$$

である。これをベクトル$\overrightarrow{OC}$の成分を用いて表すと

$$x^2 + y^2 + z^2 = \boxed{\text{ア}} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \text{①}$$

となる。

（数学Ⅱ，数学B，数学C第6問は次ページに続く。）

さらに，△ABCが正三角形であるとする。△OACと△OABは，対応する三組の辺の長さがそれぞれ等しいから合同である。したがって，対応する角の大きさも等しいから

$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC} = \boxed{\text{イ}}$$

が成り立つ。これをベクトルの成分を用いて表すと

$$x = \boxed{\text{ウ}} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \text{②}$$

となる。同様に△OBCと△OABも合同であるから

$$\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC} = \boxed{\text{イ}}$$

が成り立ち，これをベクトルの成分を用いて表すと

$$\boxed{\text{エ}}\,x + \boxed{\text{オ}}\,y = \boxed{\text{ウ}} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \text{③}$$

となる。

逆に，実数x，y，zが①，②，③を満たすとき，C(x，y，z)はS上の点であり，△ABCは正三角形になっていることがわかる。

イ の解答群

⓪ 0	① 1	② $\lvert\overrightarrow{AB}\rvert$
③ $\lvert\overrightarrow{AB}\rvert^2$	④ $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$	⑤ $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{AB}$

ウ ～ オ の解答群(同じものを繰り返し選んでもよい。)

⓪ a	① $(1+a)$	② $(1-a)$
③ a^2	④ $(1-a^2)$	⑤ $\sqrt{1-a^2}$

(数学Ⅱ，数学B，数学C第6問は次ページに続く。)

⑵ a に具体的な値を代入して，△ABC が正三角形となる S 上の点 C があるかどうかを調べよう。

(i) $a = \dfrac{3}{5}$ のとき，② と ③ を満たす実数 x，y は

$$x = \frac{\boxed{カ}}{\boxed{キ}}, \quad y = \frac{\boxed{ク}}{\boxed{ケコ}}$$

である。この x，y に対して，① を満たす実数 z は［サ］。したがって，△ABC が正三角形となる S 上の点 C は［サ］。

(ii) $a = -\dfrac{3}{5}$ のときも調べよう。(i) と同様に考えると，△ABC が正三角形となる S 上の点 C は［シ］ことがわかる。

［サ］，［シ］の解答群（同じものを繰り返し選んでもよい。）

⓪ ない	① ちょうど一つある	② ちょうど二つある
③ ちょうど三つある	④ ちょうど四つある	⑤ 無限に多くある

（数学Ⅱ，数学B，数学C 第 6 問は次ページに続く。）

⑶　△ABCが正三角形となるS上の点Cがあるための，aに関する条件を見つけよう。

実数x，y，zは，①，②，③を満たすとする。②と③から

$$x = \boxed{\text{ウ}}, \quad y = \frac{\boxed{\text{ウ}}\left(1 - \boxed{\text{エ}}\right)}{\boxed{\text{オ}}}$$

である。このとき，①から

$$z^2 = \boxed{\text{ア}} - x^2 - y^2 = \frac{\boxed{\text{ス}}}{1 + a}$$

となる。さらに，$z^2 \geqq 0$，$1 + a > 0$であるから$\boxed{\text{ス}} \geqq 0$である。

逆に，$\boxed{\text{ス}} \geqq 0$のとき，①，②，③を満たす実数x，y，zがあることがわかる。

以上のことから，$\boxed{\text{セ}}$は，△ABCが正三角形となるS上の点Cがあるための必要十分条件である。

$\boxed{\text{ス}}$の解答群

⓪ $1 - 2a$	① $(1 - a)^2$
② $(1 + 2a)^2$	③ $(1 + 2a)(1 - a)$
④ $(1 - 2a)(1 - a)$	⑤ $(1 - 2a^2)(1 + 2a)$
⑥ $(1 + 2a^2)(1 - a)$	⑦ $(1 - 2a^2)(1 - a)$

$\boxed{\text{セ}}$の解答群

⓪ $-1 < a < 1$	① $-1 < a \leqq \frac{1}{2}$	② $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leqq a \leqq \frac{\sqrt{2}}{2}$
③ $-\frac{1}{2} \leqq a \leqq \frac{1}{2}$	④ $-\frac{1}{2} \leqq a < 1$	⑤ $\frac{1}{2} \leqq a < 1$
⑥ $-1 < a \leqq -\frac{1}{2}$ または $\frac{1}{2} \leqq a < 1$		
⑦ $-1 < a \leqq -\frac{\sqrt{2}}{2}$ または $\frac{\sqrt{2}}{2} \leqq a < 1$		

第7問　（選択問題）（配点　16）

α，β，γを異なる複素数とし，複素数平面上に3点A(α)，B(β)，C(γ)をとる。直線ABと直線ACの関係について考えよう。

以下，複素数の偏角は0以上2π未満とする。

(1)　$\alpha = 3 + 2i$，$\beta = 7$，$\gamma = 7 + 10i$の場合を考える。$\dfrac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha}$の偏角を求めよう。

$$\gamma - \alpha = \boxed{\text{ア}} + \boxed{\text{イ}}\,i$$

$$\beta - \alpha = \boxed{\text{ウ}} - \boxed{\text{エ}}\,i$$

であるから

$$\frac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha} = \boxed{\text{オ}}$$

であり，$\boxed{\text{オ}}$の偏角は$\boxed{\text{カ}}$である。

$\boxed{\text{オ}}$の解答群

⓪ i	① $1 + i$	② 2	③ $2i$
④ $-i$	⑤ $1 - i$	⑥ -2	⑦ $-2i$

$\boxed{\text{カ}}$の解答群

⓪ 0	① $\dfrac{\pi}{6}$	② $\dfrac{\pi}{4}$	③ $\dfrac{\pi}{3}$
④ $\dfrac{\pi}{2}$	⑤ $\dfrac{3}{4}\pi$	⑥ π	⑦ $\dfrac{5}{4}\pi$
⑧ $\dfrac{3}{2}\pi$	⑨ $\dfrac{7}{4}\pi$		

（数学Ⅱ，数学B，数学C第7問は次ページに続く。）

⑵ $w = \dfrac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha}$ とおく。直線ABと直線ACが垂直に交わるのは，w の偏角が $\dfrac{\pi}{2}$ または $\dfrac{3}{2}\pi$ のときである。このとき，w は［キ］であるから

$$w + \overline{w} = \boxed{\text{ク}}$$

である。逆に，$w \neq 0$ に注意すると，$w + \overline{w} =$［ク］のとき，w は［キ］であるので，直線ABと直線ACが垂直に交わる。

［キ］の解答群

⓪ 0でない実数	① $1 + i$ または $1 - i$
② 純虚数(実部が0である虚数)	③ $-1 + i$ または $-1 - i$

［ク］の解答群

⓪ 0	① 1	② 2	③ i
④ $2i$	⑤ -1	⑥ -2	⑦ $-i$

（数学Ⅱ，数学B，数学C第7問は次ページに続く。）

⑶ z は 0 ， 2 ， -2 でない複素数とする。

(i) $\alpha = z$，$\beta = 2$，$\gamma = \dfrac{4}{z}$ とする。直線 AB と直線 AC が垂直に交わるための条件について考えよう。

$$\frac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha} = \frac{\dfrac{4}{z} - z}{2 - z} = 1 + \frac{2}{z}$$

が成り立つので，直線 AB と直線 AC が垂直に交わるための必要十分条件は

$$\left(1 + \frac{2}{z}\right) + \overline{\left(1 + \frac{2}{z}\right)} = \boxed{\text{ク}}$$

である。これは

$$2 + \frac{2}{z} + \frac{2}{\bar{z}} = \boxed{\text{ク}}$$

と変形できる。さらに，この両辺に $z\bar{z}$ をかけて整理すると，直線 AB と直線 AC が垂直に交わるための必要十分条件は $\boxed{\text{ケ}}$ であることがわかる。したがって，直線 AB と直線 AC が垂直に交わるような点 z 全体を複素数平面上に図示すると $\boxed{\text{コ}}$ である。

$\boxed{\text{ケ}}$ の解答群

⓪ $\lvert z\rvert = \lvert z - 4\rvert$	① $\lvert z\rvert = \lvert z - 2\rvert$
② $\lvert z\rvert = \lvert z + 4\rvert$	③ $\lvert z + 1\rvert = \lvert z - 1\rvert$
④ $\lvert z - 1\rvert = 1$	⑤ $\lvert z\rvert = 2$
⑥ $\lvert z + 1\rvert = 1$	⑦ $\lvert z\rvert = \sqrt{2}$

（数学Ⅱ，数学B，数学C 第 7 問は次ページに続く。）

コ については，最も適当なものを，次の⓪～⑦のうちから一つ選べ。

⓪



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



（数学Ⅱ，数学B，数学C第7問は次ページに続く。）

(ii) (i)のα，β，γをそれぞれ-1倍した複素数$\alpha'=-z$，$\beta'=-2$，$\gamma'=-\dfrac{4}{z}$について考える。複素数平面上の異なる3点A′(α')，B′(β')，C′(γ')について，直線A′B′と直線A′C′が垂直になるような点z全体を複素数平面上に図示すると［サ］である。

(iii) (i)のα，β，γにおいてzを$-z$に置き換え，$\alpha''=-z$，$\beta''=2$，$\gamma''=-\dfrac{4}{z}$について考える。複素数平面上の異なる3点A″(α'')，B″(β'')，C″(γ'')について，直線A″B″と直線A″C″が垂直になるような点z全体を複素数平面上に図示すると［シ］である。

（数学Ⅱ，数学B，数学C第7問は次ページに続く。）

［サ］，［シ］については，最も適当なものを，次の⓪～⑦のうちから一つずつ選べ。ただし，同じものを繰り返し選んでもよい。

⓪



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦